

## PODA EM VERDE DAS FÊMEAS E MACHOS

### MONDA DE FLORES E FRUTOS

#### ***Poda verde das fêmeas***

- Deve ser efectuada nos meses de Maio, Junho e Julho
- Eliminar os ramos ladrões e toda a madeira que não tenha fruto nem interesse para a Poda de Inverno
- Despontar os ramos frutíferos à 2ª ou 3ª folha a seguir ao último fruto de forma a tornar a planta menos compacta
- Despontar todos os rebentos demasiado compridos de forma a não prejudicar o equilíbrio nutritivo/fisiológico do pomar.



#### ***Poda verde dos machos***

- Devem ser podados até meados de Junho
- Pretende-se favorecer o aparecimento de madeira nova, afim de obter uma boa quantidade e qualidade de pólen e promover o arejamento no centro da copa
- Os ramos velhos sem gomos florais devem ser suprimidos pela base para que se favoreça o desenvolvimento de um novo ramo
- Nos pomares mais antigos, se quiser orientar os machos como as fêmeas, deve cortar um em cada cinco machos abaixo do arame, no decorrer do mês de Junho
- Nos pomares novos, uma vez que os machos já estão a ser conduzidos como as fêmeas não é necessário efectuar este procedimento

#### ***Monda de Flores***

- Esta operação é feita antes da floração, com objectivo de eliminar os botões florais deformados e os laterais.



#### ***Monda de frutos***

- Esta operação é habitual quando se pretendem obter produções de qualidade.
- Realiza-se imediatamente depois do vingamento do fruto, eliminando os frutos miúdos mal polinizados, bem como os deformados e os laterais que não foram suprimidos na prefloração.
- Deve procurar-se um equilíbrio entre a frutificação e a vegetação, recomendando-se não deixar mais de 4 a 5 frutos por lançamento frutífero.

